

Comprometidos con el alivio del dolor neuropático



Indicado para el tratamiento del **dolor neuropático periférico y central** en adultos.<sup>1</sup>



Recomendado por guías internacionales como 1ª línea de tratamiento para el **dolor neuropático**.<sup>2</sup>



Eficaz para el **tratamiento de las comorbilidades**asociadas con el **dolor neuropático**.<sup>3</sup>



## La triada del dolor, sueño y ansiedad o depresión<sup>4</sup>

En los pacientes que sufren de dolor crónico, existe una relación bidireccional en la que los trastornos del sueño se presentan como consecuencia del dolor.

consecuencia del dolor, y al mismo tiempo, son la causa de una mayor percepción del dolor.

TRASTORNOS DEL SUEÑO



#### **DOLOR**



A causa de una mayor percepción del dolor, se determina la disminución en la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana por lo tanto, aumenta la incidencia de la depresión.



ANSIEDAD O DEPRESIÓN






Comprometidos con el alivio del dolor neuropático

**Lyrica**<sup>®</sup> es una opción de tratamiento eficaz para la **neuralgia posherpética**<sup>5</sup>

4

**Lyrica**® es eficaz para reducir el dolor en pacientes con **neuropatía diabética dolorosa**<sup>6</sup>


# Variación media (LS) del punto de referencia inicial en la puntuación DPRS



Estudio doble ciego, controlado con placebo con duración de 8 semanas en pacientes (n=220) con neuralgia posherpética, aleatorizados 1:1 para recibir **Lyrica**® (300 mg al día) o placebo.

**DPRS:** Escala de calificación diaria del dolor; **LS:** Mínimos cuadrados. **PRS:** Escala de calificación diaria del dolor.

#### **DOLOR**




Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, multicéntrico con duración de 14 semanas. Los pacientes con NDD (n=317) fueron aleatorizados para recibir placebo o **Lyrica**® 300 mg o 600 mg al día.

LS: Cuadrados mínimos; NDD: Neuropatía diabética dolorosa.



Mejoría importante en el trastorno del sueño con la administración de **Lyrica**<sup>®</sup> **Puntuación del trastorno del sueño**<sup>7</sup>

### Neuralgía Posherpética (NPH)




Placebo

Lyrica<sup>®</sup>

# IK.

## Neuropatía Diabética Dolorosa (NDD)



\* p< 0.05 vs placebo

Los participantes con NPH (N=272) fueron aleatorizados para recibir tratamiento en dosis fija de 150 mg, 300 mg o 600 mg al día de **Lyrica**® o placebo, administrado dos veces al día durante 12 semanas; los participantes con NDD (n=179) fueron aleatorizados para recibir tratamiento en dosis fijas de 300 mg o 600 mg al día de **Lyrica**® o placebo, administrado dos veces al día durante 12 semanas. Después de una semana, el tratamiento con **Lyrica**® estuvo asociado con una mejoría en la puntuación de la interferencia en el sueño (p < 0.05), en comparación con el placebo.



Comprometidos con el alivio del dolor neuropático







#### Referencias

- 1. Información para prescribir Lyrica® cápsula
- 2. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015;14(2):162-73.
- Azmi S, ElHadd KT, Nelson A, et al. Pregabalin in the management of painful diabetic neuropathy: a narrative review. Diabetes Ther. 2019;10:35-56
- 4. Jain R, Webb D. Chronic pain: Addressing the triad of pain, sleep and depression/anxiety. SA Journal of Diabetes. 2016;9(3):7-11.
- 5. Liu Q, Chen H, Xi L, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the efficacy and safety of pregabalin for postherpetic neuralgia in a population of Chinese patients. Pain Practice. 2017;17(1):62-9.
- **6.** Satoh J, Yagihashi S, Baba M, et al. Efficacy and safety of pregabalin for treating neuropathic pain associated with diabetic peripheral neuropathy: a 14 week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabet Med. 2011;28:109-16.
- 7. Ogawa S, Arakawa A, Hayakawa K, et al. Pregabalin for the neuropathic pain: why benefits could be expected for multiple pain conditions. Clin Drug Investig. 2016;36:877-8.

Para mayor información y un listado de eventos adversos consulte la IPP escaneando este código QR

Lyrica® Cápsula



Lyrica® Solución

LYRICA

150 mg





LYRICA

 Producto
 Reg. San.
 No. de IPP
 VMAP
 No. de Aviso

 Lyrica® Cápsula Lyrica® Solución
 530M2004 SSA IV 186M2014 SSA IV 23330022130225
 23330022130971 23330022130225
 MX-LYR-2024-00008
 2415052002C01040

Material exclusivo para profesionales de la salud. Su venta requiere receta médica.