



TRIADA

PARA EL MANEJO HOLÍSTICO DEL PACIENTE CON DM2

Metabólico^{1,2}



Eficaz en un **amplio espectro de pacientes** con DM2 en monoterapia, terapia complementaria y terapia dual.⁶⁻¹¹

Como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes con DM2.^{1,2}

Recupera el **Control**
glucémico
de tu vida

Etiopatogénico³

Thioctacid® **600 HR**
Ácido tióctico

- **MEJORA** •
El flujo sanguíneo al nervio periférico
- **AUMENTA** •
La velocidad de conducción nerviosa.^{12,13}



El consenso multidisciplinario de expertos Mexicanos de 2023, recomienda el Ácido Tióctico como tratamiento etiopatogénico de 1ª línea en la Neuropatía Diabética.¹⁴

Sintomático^{4,5}



Recomendado por guías internacionales como **1ª línea de tratamiento** para el **Dolor Neuropático**.¹⁵



La única **PREGABALINA** en solución oral indicada para el **Dolor Neuropático**.³



TRIADA

PARA EL MANEJO HOLÍSTICO DEL PACIENTE CON DM2

Metabólico^{1,2}



Etiopatogénico³

Thioctacid® 600 HR
Ácido tióctico



Sintomático^{4,5}



25 mg, 300 mg y Solución Oral son presentaciones exclusivas que Lyrica® le ofrece a su paciente.

1. Información para prescribir Galvus® Comprimido **2.** Información para prescribir Galvus® Met Comprimido **3.** Información para prescribir Thioctacid 600 HR® Tableta **4.** Información para prescribir Lyrica® Cápsula **5.** Información para prescribir Lyrica® Solución Oral **6.** Pan C, Wang X. Profile of vildagliptin in type 2 diabetes: efficacy, safety, and patient acceptability. Ther Clin Risk Manag. 2013;9:247-257. doi:10.2147/TCRM.S30071 **7.** Chawla M, Kim TH, Mirasol RC, et al. Initial combination therapy with vildagliptin plus metformin in drug-naïve patients with T2DM: a 24-week real-life study from Asia. Curr Med Res Opin. 2018;34(9):1605-1611. **8.** Matthews DR, Paldanius PM, Proot P, et al. Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet. 2019;394(10208):1519-1529. **9.** Odawara, M., Hamada, I. & Suzuki, M. Efficacy and Safety of Vildagliptin as Add-on to Metformin in Japanese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes Ther 5, 169-181 (2014). **10.** Al-Arouj M, Hassoun AA, Medlej R, et al. The effect of vildagliptin relative to sulphonylureas in Muslim patients with type 2 diabetes fasting during Ramadan: the VIRTUE study. Int J Clin Pract. 2013;67(10):957-963. **11.** Kothny W, Foley J, Kozlovski P, Shao Q, Gallwitz B, Lukashevich V. Improved glycaemic control with vildagliptin added to insulin, with or without metformin, in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab. 2013;15(3):252-257. **12.** Ziegler D, Low PA, Litchy WJ, et al. Efficacy and safety of antioxidant treatment with α-lipoic acid over 4 years in diabetic polyneuropathy: the NATHAN 1 trial. Diabetes Care. 2011;34(9):2054-2060 **13.** Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Djukic S, Stefanović S, Nurkovic J. Comparative analysis of the effects combined physical procedures and α-lipoic acid on the electroneurographic parameters of patients with distal sensorimotor diabetic polyneuropathy. J Phys Ther Sci. 2016;28(2):432-437. **14.** Guillén-Núñez MR, Araujo-Navarrete ME, Duarte-Vega M, Fonseca-Soliz DI, Hernández-Porras BC, Lara-Solares A, et al. Manejo racional de las neuropatías diabéticas: consenso multidisciplinario de expertos. Rev Mex Anestesiología. 2023; 46 (3): 184-190. **15.** Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015;14(2):162-73.

Material exclusivo para profesionales de la salud. Su venta requiere receta médica. Vigencia: 22 de julio de 2025

Producto	Reg. San.	No. de IPP	VMAP	Content ID	No. de Aviso Viátris	No. de Aviso Novartis
Lyrica® Cápsula	530M2004 SSA IV	23330022130971				
Lyrica® Solución	186M2014 SSA IV	23330022130225				
Thioctacid® 600 HR Tableta	594M2004 SSA IV	213300416X0152	MX-LYR-2024-00011	FA-11235488	2415052002C01420	2409052002C00294
Galvus® Comprimido	045M2007 SSA IV	23330022131118				
Galvus Met® Comprimido	180M2008 SSA IV	23330022131117				

Para mayor información y un listado de eventos adversos consulte la IPP escaneando este código QR

Galvus®
Comprimido



Galvus Met®
Comprimido



Thioctacid® 600 HR
Tabletas



Lyrica®
Cápsula



Lyrica®
Solución



Viátris: Av. Santa Fé 440-piso 8, Lomas de Santa Fé, Contadero, Cuajimalpa de Morelos 05349 Ciudad de México, CDMX
Novartis: Av. Insurgentes Sur 2475, Tizapán San Ángel, San Ángel, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX