


Los pacientes con **diabetes mellitus** tipo 2 que son **adultos mayores**, con fragilidad o múltiples comorbilidades, tienen un **alto riesgo de presentar episodios de hipoglucemia**.¹



En **todos los pacientes adultos mayores** debe establecerse una **evaluación del riesgo de hipoglucemia**.¹

En *adultos mayores* con Galvus®²



Vildagliptina
REDUCE
significativamente



de **HbA1c** en pacientes mayores²

Producto	Reg. San.	No. IPP	No. Aviso	VMAP	CONTENT ID
Galvus® comprimido	045M2007 SSA IV	23330022131118	2409052002C00381	MX-GGT-2024-00011	FA-11297971
Galvus® Met comprimido	180M2008 SSA IV	23330022131117			

Vigencia: 30 de octubre de 2025.

REFERENCIAS: **1.** ElSayed, N. A., Aleppo, G., Bannuru, R. R., Bruemmer, D., Collins, B., Ekhlaspour, L., Hilliard, M. E., Johnson, E. L., Khunti, K., Lingvay, I., Matfin, G., McCoy, R. G., Perry, M. L., Pilla, S. J., Polsky, S., Prahalad, P., Pratley, R. E., Segal, A. R., Seley, J. J., . . . Gabbay, R. A. (2023b). 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Supplement 1), S111-S125. <https://doi.org/10.2337/dc24-s006> **2.** Strain WD, Lukashevich V, Kothny W, Hoellinger MJ, Paldánus PM. Individualised treatment targets for elderly patients with type 2 diabetes using vildagliptin add-on or lone therapy (INTERVAL): a 24 week, randomised, double-blind, placebo-controlled study. *Lancet*. 2013;382(9890):409-416. doi:10.1016/S0140-6736(13)60995-2



Av. Santa Fe 440-piso 8, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05349 Ciudad de México, CDMX

© 2024 VIATRIS – Todos los Derechos Reservados.
Material de uso exclusivo para profesionales de la salud. Su venta requiere receta médica.
Al acceder al contenido desde cualquier enlace dentro de este correo electrónico, confirma que es un profesional de la salud.

Para darse de baja o administrar sus suscripciones, haga clic [aquí](#).

[Política de Privacidad](#) | [Reporte de Evento Adverso](#)

MX-GGT-2024-00011