LYRICA® PREGABALINA 20 AÑOS

EXPERIENCIA 20 AÑOS CLINICA[1] — LA PREGABALINA DE REFERENCIA[2] — DE TRATAMIENTO PRIMERA LÍNEA PARA DOLOR NEUROPÁTICO[3]

El rango de dosis de **Lyrica®** para **DOLOR NEUROPÁTICO** es de **150 a 600 mg por día**, dividiendo su **administración en dos o tres dosis.**[4, 5]

Día	Noche
75 mg	**75 mg**

El tratamiento con **pregabalina** puede iniciarse con una dosis de **150 mg por día**.[4, 5]

Día	Noche
150 mg	**150 mg**

Basándose en la respuesta individual del paciente y su tolerabilidad, la dosis puede incrementarse a **300 mg por día** después de un intervalo de **3 a 7 días**.[4, 5]

Día	Noche
300 mg	**300 mg**

Si es necesario, se puede alcanzar una **dosis máxima de 600 mg por día** después de un intervalo adicional de **7 días**.[4, 5]

1. **Lyrica®** Primer registro SSA México 04363102598.
2. COFEPRIS, Listado actualizado de medicamentos de referencia 2024/02.
3. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and metaanalysis. Lancet Neurol 2015;14:162–73.
4. Información para prescribir **Lyrica® Cápsula**.
5. Información para prescribir **Lyrica® Solución Oral.**

LYRICA® PREGABALINA 20 AÑOS

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL[4, 5]

TID = tres dosis al día.
BID = dos dosis al día.
QD = una dosis al día.

* La dosis total diaria (mg/día) debe dividirse como lo indica el régimen de dosificación para proporcionar mg/dosis.

* La dosis complementaria es una dosis única adicional.

AJUSTE DE DOSIS DE PREGABALINA CON BASE EN LA FUNCIÓN RENAL

Depuración de creatinina (CLcr) (mL/min)	**Dosis inicial** (mg/día)	**Dosis máxima** (mg/día)	**Régimen de dosificación**
≥60	150	600	BID o TID
≥30 - <60	75	300	BID o TID
≥15 - <30	25-50	150	QD o BID
<15	25	75	QD
Dosis complementaria después de hemodiálisis (mg)			
	25	100	Dosis única*

PARA PACIENTES QUE RECIBEN HEMODIÁLISIS

La dosis diaria de **pregabalina** debe ajustarse basándose en el funcionamiento renal. Además de la dosis diaria, se debe administrar una dosis complementaria inmediatamente después de terminar cada sesión de hemodiálisis de 4 horas.[4, 5]

Para mayor información consulta la IPP escaneando estos códigos QR.

Lyrica® Cápsula

Lyrica® Solución

Material exclusivo para profesionales de la salud. Su venta requiere receta médica.

Producto	**Reg. San.**	**No. de IPP**	**VMAP**	**No. de Aviso**
Lyrica® Cápsula	530M2004 SSA IV	233300001X0010	MX-LYR-2025-00005	2515052002C01059
Lyrica® Solución	186M2014 SSA IV	233300001X0014		

VIATRIS